Risiko obesitas pada anak kelas 3, 4, 5 yang tidak sarapan di SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Ciracas Jakarta Timur

Like Ingrid Samsudin^a, Titus Priyo Harjatmo^{a,1}, Sugeng Wiyono^a, Nils Aria Zulfianto^a

^aJurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, Jln. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta 12120

¹titoespriyo@yahoo.co.id*

*korespondensi penulis

Kata kunci:

Sarapan,
Obesitas,
Siswa Sekolah
Dasar, Status
Gizi

ABSTRAK

Latar Belakang: Jumlah anak sekolah yang melakukan sarapan pagi di Jakarta masih rendah padahal hal tersebut sangat penting untuk menjaga keseimbangan asupan gizi. Sebagai gantinya, anak sekolah membeli jajanan yang kurang sehat atau cenderung makan lebih banyak sehingga membuat risiko obesitas menjadi tinggi di kalangan anak sekolah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebiasaan sarapan dengan status obesitas anak sekolah dasar pada siswa kelas 3,4,5 SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Ciracas Jakarta Timur. **Metode:** Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan penarikan subjek secara systematic random sampling. Subjek berjumlah 123 siswa dari 196 siswa kelas 3,4,5. Data yang dikumpulkan adalah karakteristik siswa, kebiasaan sarapan, dan status gizi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak sarapan (51.2%). Berdasarkan hasil uji statistik diketahui adanya hubungan antara kebiasaan sarapan dengan status gizi ($p < 0.05$). Berdasarkan hasil analisis odd ratio dapat disimpulkan bahwa siswa yang tidak sarapan 6.2 kali (95% CI=2.6-14.7) berisiko terjadinya obesitas dibanding anak yang sarapan. **Kesimpulan:** mayoritas siswa sekolah dasar melewati sarapan sebelum berangkat sekolah dan hanya sebagian siswa yang sarapan secara rutin. Anak yang tidak sarapan mempunyai risiko untuk obesitas dibandingkan anak yang sarapan.

ABSTRACT

Key words:

Breakfast,
Elementary
School Child,
Obesity,
Nutritional
Status

Background : The number of school-aged children who had breakfast in Jakarta is low. In fact, school children can get balanced nutrition from having breakfast. Instead of having breakfast, children get the energy from snacks or eat more that might make them have higher risk to be obese. **Objectives :** This study aims to determine the relationship of breakfast habits with nutritional status in elementary school children in grade 3,4,5 SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Ciracas, East Jakarta. **Method :** The cross sectional study was applied. The subjects was selected in systematic random sampling. Subjects were 123 students from 196 students in grade 3,4,5. The data collected are the characteristics of students breakfast habits and nutritional status. **Results :** The result showed that most students did not do breakfast (51.2%). Based on the results of chi square test showed the relationship between breakfast habits with nutritional status ($p < 0.05$). Based on the results of odd ratio analysis can be concluded that students who skip breakfast 6.2 times (95% CI=2.6-14.7) the risk of obesity in children who eat breakfast. **Conclusion :** Most elementary students skip breakfast before leaving for school and only a few students eat breakfast regularly. Students who skip breakfast have higher risk of obesity.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.

Pendahuluan

Anak usia sekolah adalah generasi penerus bagi pembangunan di masa depan dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sistematis dan berkesinambungan¹. Anak-anak sekolah dasar merupakan salah satu kelompok yang rawan mengalami gizi kurang diantara penyebabnya ialah tingkat ekonomi yang rendah dan asupan makanan yang kurang seimbang serta rendahnya pengetahuan orang tua. Anak sekolah dengan pola makan seimbang cenderung memiliki status gizi yang baik².

Berdasarkan hasil survei konsumsi pangan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2010), masih banyak anak yang tidak terbiasa sarapan sehat. Sarapan merupakan sumber energi sebelum berangkat ke sekolah dan diperlukan untuk aktivitas dan belajar di sekolah³. Sarapan dibutuhkan untuk mengisi yang telah kosong selama 8-10 jam dan bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan konsentrasi belajar dan kemampuan fisik⁴. Sarapan mampu memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian yaitu 15-30% AKG dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif dan cerdas¹⁵. Konsumsi sarapan secara teratur dapat berkaitan dengan IMT normal dan berhubungan dengan berat badan yang lebih sehat⁶. Namun, hasil tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten pada penelitian lainnya⁷.

Berdasarkan analisis dari hasil survei dapat diketahui bahwa dari 35.000 anak usia sekolah sekitar 26,1% sarapan hanya dengan air minum dan 44,6% memperoleh asupan energi kurang dari 15% kebutuhan gizi per hari⁴. Berdasarkan penelitian pada SD Unggulan dan Non Unggulan di Jakarta Timur diperoleh 7.83% rata-rata memiliki kebiasaan sarapan pagi pada sekolah unggulan dan 8.30% rata-rata memiliki kebiasaan sarapan pagi pada sekolah non unggulan di Jakarta Timur⁶.

Dari masalah tersebut, penulis ingin mengetahui hubungan sarapan dengan status gizi khususnya risiko obesitas pada anak SD khususnya di SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Ciracas Jakarta Timur.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status obesitas anak sekolah dasar.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 2018 di SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Ciracas Jakarta Timur. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3-5 yang terdapat di SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Ciracas Jakarta Timur yang berjumlah 196 orang siswa.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*. Didapatkan sampel sejumlah 123 sampel yang didapat dengan perhitungan rumus sampel jumlah populasi diketahui.

Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang bersumber langsung dari subjek. Data yang diambil meliputi variabel usia, jenis kelamin yang diukur dengan wawancara menggunakan kuesioner. Variabel berat badan, tinggi badan diukur secara antropometri. Variabel status gizi menurut indeks IMT/U dihitung berdasarkan parameter berat badan dan tinggi bada. Variabel berat badan, tinggi badan dan kebiasaan sarapan diolah secara deskriptif untuk mengidentifikasi nilai rata rata, minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel asupan energi-protein sarapan dan energi-protein sehari.

Data dianalisis dengan analisis deskriptif univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan uji Chisquare dan Odd Ratio menggunakan software statistic. Penelitian ini telah lulus kaji etik dari Unit Penelitian Etik Kesehatan Politeknik Kesehatan Jakarta II.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner, gambaran umum siswa SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi menurut karakteristik siswa ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik siswa

Karakteristik siswa	n	%
Jenis kelamin		
Perempuan	57	46.3
Laki-laki	66	53.7
Umur (tahun)		
8	1	0.8
9	22	17.9
10	37	30.1
11	48	39.0
12	15	12.2
Jumlah	123	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa karakteristik siswa berdasarkan jenis kelamin, sebagai besar berjenis kelamin laki-laki (46.3%). Karakteristik siswa berdasarkan umur sebagian besar berumur 11 tahun (39.0%).

Kebiasaan sarapan dilihat dalam beberapa kategori yaitu frekuensi sarapan, waktu sarapan, lokasi sarapan, cara memperoleh sarapan, jenis sarapan, jenis minuman sarapan, alasan tidak sarapan, dan kecukupan asupan energi dan protein.

Menurut kebiasaan sarapan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi frekuensi berdasarkan Kategori Sarapan

Kategori Sarapan	n	%
Sarapan	60	48.8
Tidak sarapan	63	51.2
Jumlah	123	100.0

Berdasarkan tabel diatas mayoritas siswa melewati sarapan sebelum berangkat ke sekolah (51.2%) dan hanya (48.8%) siswa yang sarapan secara rutin.

Melewatkan sarapan berhubungan dengan usia, jenis kelamin, etnis dan budaya, pendapatan, dan tingkat aktivitas fisik diantara anak laki-laki disekolah dasar dan anak perempuan di sekolah menengah⁶. Frekuensi sarapan berkontribusi untuk mengurangi peningkatan selera makan dan pencegahan terjadinya kenaikan berat badan sesuai dengan Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, frekuensi sarapan (dalam minggu) siswa SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi tergolong dalam kategori sering (≥ 4 kali). Menurut hasil penelitian sebelumnya anak yang membiasakan mengonsumsi sarapan menambah pemenuhan kebutuhan zat gizi sehari-hari dan meningkatkan motivasi anak untuk beraktivitas². Melewatkan sarapan dan pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan metabolisme abnormal dan mungkin menyebabkan obesitas⁸.

Siswa yang sarapan pagi dibawah jam 9 atau sebelum melakukan aktivitas, lebih dapat berkonsentrasi dalam belajar, karena ketika mereka belajar disekolah perut mereka sudah terisi dengan sarapan sebelum aktivitas atau pelajaran dimulai⁹.

Tabel 3. Distribusi frekuensi berdasarkan frekuensi sarapan

Frekuensi sarapan (per minggu)	n	%
Sering (≥ 4 kali)	58	47.2
Kadang-kadang (2-3 kali)	53	43.1
Jarang (< 2 kali)	12	9.8
Jumlah	123	100

Siswa melakukan sarapan sebelum jam 7.00 pagi dikarenakan kegiatan sekolah dimulai pada pukul 6.30 pagi dan sarapan dilakukan sebelum masuk sekolah atau sebelum melakukan aktivitas. Tabel 4 menunjukkan mayoritas siswa SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi tergolong melakukan sarapan jam 7 pagi atau sebelum jam 9 pagi (82%).

Jarak antara rumah ke sekolah cenderung dekat karena contoh tinggal masih di dekat lingkungan sekolah. Siswa yang melakukan sarapan disekolah biasanya membawa bekal dari rumah atau membeli makanan jajanan di sekolah.

Anak yang melakukan sarapan di rumah cenderung mengonsumsi sarapan yang lebih sehat, sedangkan anak yang mengonsumsi sarapan selain di rumah akan cenderung membeli jajanan diluar dan biasanya adalah makanan yang kurang sehat¹⁶

Kebiasaan sarapan pada anak tumbuh karena pembiasaan yang telah dilakukan sejak dini. Dalam hal ini orang tua mempunyai peran penting untuk membiasakan perilaku sarapan di pagi hari¹⁰. Selain itu orang tua juga bertanggung jawab untuk menyediakan sarapan yang mengandung gizi dan nutrisi yang dibutuhkan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu faktor yang membentuk kebiasaan makan anak adalah lingkungan keluarga. Peran ibu dalam keluarga, terutama dalam merawat dan mengurus keluarga. Berdasarkan penelitian sebelumnya orang tua khususnya ibu mempunyai peranan penting dalam membentuk kebiasaan sarapan pada anak.

Berdasarkan Tabel 5, hampir seluruh siswa di SDN Kelapa Dua Wetan 3 Pagi melakukan sarapan di rumah (48%).

Tabel 5. Distribusi frekuensi berdasarkan lokasi sarapan

Lokasi Sarapan	n	%
Di rumah	59	48.0
Di sekolah	1	0.8
Tidak sarapan	63	51.2
Jumlah	123	100

Jenis makanan yang dikonsumsi saat sarapan menentukan kualitas sarapan dan energi yang dihasilkan dari sarapan. Berdasarkan penelitian terdahulu sarana utama dari segi gizi untuk memenuhi kebutuhan energi anak sekolah adalah sarapan pagi. Tanpa sarapan pagi, akan terjadi kekosongan lambung sehingga kadar glukosa menurun. Glukosa darah merupakan sumber energi utama bagi otak, sehingga anak akan kesulitan menerima pelajaran dengan baik.⁵

Konsumsi sarapan sebaiknya terdiri dari makanan lengkap yaitu makanan dan minuman yang mengacu pada pedoman gizi seimbang, yaitu mengandung semua unsur gizi yang diperlukan oleh tubuh seperti pemenuhan karbohidrat dan zat gizi lainnya seperti

protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat. Secara umum, jenis komposisi pangan pada anak telah memenuhi kebutuhan minimal sarapan yakni terdiri dari makanan pokok dan lauk hewani. Berdasarkan Tabel 6 jenis sarapan yang dikonsumsi oleh siswa SD Kelapa Dua Wetan 03 Pagi.

Tabel 6. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis sarapan

Jenis sarapan	n	%
Biskuit	3	2.4
Bubur ayam	1	0.8
Nasi + LH/LN	11	8.9
Nasi + sayur	2	1.6
Nasi goreng	33	26.8
Roti + selai	10	8.1
Tidak sarapan	63	51.2
Jumlah	123	100

Jika dibandingkan dengan anjuran pemberian makanan pada anak usia sekolah yang memerlukan zat gizi cukup tinggi sedianya dapat terpenuhi apabila konsumsi makanan bervariasi sehingga masih perlu ditingkatkan asupan zat gizi sarapan pada siswa⁵, karena bagaimanapun anak sekolah memerlukan zat gizi yang baik terutama berasal dari sarapan untuk menunjang aktivitas pada pagi hari di sekolah. Ketika seorang anak tidak mampu memenuhi gizi di rumah sebelum berangkat ke sekolah ada baiknya pemenuhan dilakukan di sekolah saat istirahat pada pagi hari. Harapannya dapat memenuhi 15% asupan gizi sarapan, sebanyak (51.2%) anak yang tidak sarapan hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu kebiasaan sarapan berhubungan dengan kebiasaan jajan di sekolah dengan risiko sebesar 1,5 kali, artinya anak yang tidak sarapan memiliki kecenderungan memiliki kebiasaan jajan 1,5 kali lebih besar dibandingkan anak yang sarapan².

Ketersediaan makanan sarapan di rumah sangatlah penting karena merupakan faktor yang sangat mendukung anak untuk terbiasa sarapan pagi. Jika makanan tersedia setiap hari, khususnya makanan dan minuman sarapan tentu mempengaruhi faktor psikologis si anak yang akan memberikan pengaruh dalam membentuk pola makan yang sehat pada anak²¹.

Berbagai faktor penyebab anak di berbagai kota besar tidak melakukan sarapan. Beberapa faktor yang memengaruhi kebiasaan sarapan antara lain: usia anak, jenis kelamin anak, pengetahuan anak mengenai kesehatan dan gizi, ketersediaan makanan pagi di rumah, waktu tempuh atau jarak antara rumah dengan sekolah, jumlah uang saku, kebiasaan jajan yang mengenyangkan^{17,18}. Berdasarkan Tabel 7 alasan siswa tidak sarapan yaitu tertinggi dengan alasan tidak lapar (25.2%) kemudian diikuti dengan takut terlambat (14.6%).

Sarapan yang terlewat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain waktu sarapan karena telat bangun pagi, merasa tidak sehat saat sarapan, tidak lapar dipagi hari, persepsi tubuh ideal bagi anak perempuan (seperti model) dikenali sebagai penjelasan karena melewatkan sarapan sebelum berangkat ke sekolah¹⁹.

Tabel 7. Distribusi frekuensi berdasarkan alasan tidak sarapan

Alasan tidak sarapan	n	%
Kesiangn	1	0.8
Takut terlambat	18	14.6
Tidak ada waktu	8	6.5
Tidak lapar	31	25.2
Tidak nafsu makan	2	1.6
Tidak suka sarapan	3	2.4
Sarapan	60	48.8
Jumlah	123	100.0

Berdasarkan Tabel 8, siswa SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Jakarta Timur rata-rata mengonsumsi energi pada saat sarapan sebesar 311.2 kalori dan rata-rata siswa konsumsi protein sebesar 10.8 g. Energi tertinggi yang dikonsumsi siswa pada saat sarapan yaitu 730,5 kalori dan protein tertinggi dikonsumsi pada saat sarapan yaitu 29,6 g. Bila dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi untuk energi dan protein pada anak sekolah pada laki-laki dan perempuan sebesar 2050 kkal dan 50 gram. Dengan demikian asupan energi dan protein untuk sarapan memenuhi sebesar 15,2% dan 21,6%. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan mulai dari bangun tidur dipagi hari sampai jam 9 untuk memenuhi sekitar 15-25% kebutuhan gizi sehari untuk mewujudkan hidup yang sehat, aktif dan cerdas.

Tabel 8 Distribusi frekuensi berdasarkan asupan energi dan protein sarapan

Zat gizi	n	$\bar{X}$	Min	Max	SD
Energi (Kalori)	123	311.2	0.0	730.5	166.7
Protein (g)	123	10.8	0.0	29.6	6.70

Data asupan zat gizi siswa dilakukan dengan metode recall asupan kebiasaan makan. Berdasarkan Tabel 9, siswa SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Jakarta Timur rata-rata mengonsumsi energi sehari sebesar 1372.9 kalori dan rata-rata siswa konsumsi protein sebesar 46.5 g. Energi tertinggi yang dikonsumsi siswa pada saat sarapan yaitu 2915,5 kalori dan protein tertinggi dikonsumsi pada saat sarapan yaitu 114,2 g.

Tabel 9 Distribusi frekuensi berdasarkan asupan energi dan protein sehari

Zat gizi	n	$\bar{x}$	Min	Max	SD
Energi (Kalori)	123	1372.9	558.8	2915.5	403.5
Protein (g)	123	46.5	14.6	114.2	16.5

Status Gizi

Penentuan status gizi pada anak menggunakan indeks antropometri IMT/U berdasarkan pengkategorian z-score dibagi menjadi empat kategori yaitu sangat kurus, kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Distribusi frekuensi berdasarkan status gizi siswa SDN Kelapa Dua

Wetan 03 Pagi Jakarta Timur disajikan pada Tabel 9. Berdasarkan Tabel 9. Status gizi siswa di SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Jakarta Timur hampir semua dengan status gizi normal (53.7%) dan status gizi tertinggi kedua yaitu gemuk/obesitas (17.1%).

Tabel 10. Distribusi frekuensi berdasarkan status gizi

Status gizi	N	%
Sangat kurus	4	3.3
Kurus	11	8.9
Normal	66	53.7
Gemuk	21	17.1
Obesitas	21	17.1
Jumlah	123	100.0

Dalam penelitian ini status gizi dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu normal dan obesitas. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar sampel (65.9%) berstatus gizi normal sedangkan sisanya berstatus gizi obesitas dengan persentase (34.1%) atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa prevalensi obesitas pada anak Sekolah Dasar di SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Jakarta Timur adalah 34.1%. Jika dilihat dari kategori sarapan, sebagian besar sampel yang obesitas tidak melakukan sarapan sebelum berangkat ke sekolah yaitu 52.4%.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0.000$ ($p < 0.05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara kebiasaan sarapan dengan status gizi sampel anak SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Jakarta Timur. Berdasarkan hasil analisis odds ratio pada Tabel 11, dapat disimpulkan bahwa siswa yang tidak sarapan memiliki 6.2 kali (95% CI=2.6-14.7) risiko terjadinya obesitas dibanding anak yang sarapan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yakni anak-anak yang ibu dan ayahnya melewatkan sarapan kemudian lebih banyak untuk mengikuti tidak sarapan dibandingkan dengan mereka yang orang tuanya mencontohkan sarapan kepada anaknya dan anak-anak yang tidak sarapan memiliki 18-116% peningkatan risiko kelebihan berat badan/obesitas dengan OR = 1.18 (95% CI ; 1.05-1.32) dan 2.16 (95% CI ; 1.55-2.99)²⁰.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa faktor yang mendasari peningkatan jumlah orang obesitas adalah melewatkan sarapan. Hal ini disebabkan anak yang melewatkan sarapan dapat mempengaruhi tingkat nafsu makan anak-anak tetapi bukan meningkatkan asupan energi pada waktu makan berikutnya melainkan mereka secara signifikan kelaparan dan bisa mengonsumsi lebih banyak makanan sebelum makan siang¹². Dengan demikian maka risiko terjadinya obesitas lebih besar pada anak yang tidak sarapan dibandingkan dengan anak yang sarapan. Hal lain melewatkan sarapan dapat menyebabkan tidak hanya penurunan aktivitas fisik di pagi hari tetapi juga penurunan metabolisme energi. Penurunan konsentrasi gula darah serum akibat melewatkan sarapan mengakibatkan kerusakan jaringan otot melalui jalur glukoneogenesis sebagai sarana untuk menyediakan glukosa untuk otak. Ketika lapar mereka dapat menghemat energi dengan membatasi aktivitas fisik yang dapat menghasilkan kondisi dimana tubuh tidak menurunkan berat badan tetapi sebaliknya menambah berat badan dengan mudah⁸.

Anak yang melewatkan sarapan dapat mempengaruhi tingkat nafsu makan anak-anak tetapi bukan meningkatkan asupan energi pada waktu makan berikutnya melainkan

mereka secara signifikan kelaparan dan bisa mengonsumsi lebih banyak makanan sebelum makan siang¹².

Berdasarkan penelitian terdahulu melewatkan sarapan juga dapat meningkatkan 1.2 kali risiko diabetes tipe 2. Makanan yang dikonsumsi saat sarapan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pelepasan dan aktivitas hormon, sekresi insulin, metabolisme lipid dan glukosa. Konsumsi sarapan dapat meningkatkan respon glikemik dan sensitivitas insulin dimana juga dapat mengurangi kadar kolesterol LDL¹³.

Hal serupa sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu pria yang melewatkan sarapan memiliki faktor risiko 21% mengidap diabetes tipe 2 lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang mengonsumsi sarapan secara rutin.

Tabel 11. Sebaran status gizi berdasarkan kebiasaan sarapan

Kebiasaan Sarapan	Status gizi				Total		OR
	Obesitas		Normal				
	n	%	n	%	n	%	
Tidak sarapan	33	52.4	30	47.6	63	100	6,2 (CI = 2,6-14,7)
Sarapan	9	15.0	51	85.0	60	100	
Total	42	34.1	81	65.9	123	100	

Kesimpulan dan Saran

Siswa SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi Jakarta Timur mayoritas melewatkan sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan hanya sebagian dari siswa yang sarapan secara rutin. Anak yang tidak sarapan mempunyai risiko 6,2 kali untuk obesitas dibandingkan anak yang sarapan.

Referensi

1. District S, Tenggara N, Province T. Kebiasaan sarapan tidak berhubungan dengan status gizi anak sekolah dasar di Kabupaten Timor Tengah Selatan , Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2015;3(2):77–86.
2. Anzarkusuma, I., Mulyani, E., Jus'at, I., & Angkasa, D. (2014). Status Gizi Berdasarkan Pola Makan Anak Sekolah Dasar Di Kecamatan Rajeg Tangerang (Nutritional Status Based On Primary School Student's Dietary Intake In Rajeg District Tangerang City. Indonesian Journal of Human Nutrition, 1(2), 135-148. Retrieved from <https://ijhn.ub.ac.id/index.php/ijhn/article/view/109/115>.
3. Sofianita, N., Arini, F., & Meiyetrian, E. (2015). Peran Pengetahuan Gizi Dalam Menentukan Kebiasaan Sarapan Anak-Anak Sekolah Dasar Negeri Di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Jurnal Gizi Dan Pangan, 10(1). doi:<http://dx.doi.org/10.25182/jgp.2015.10.1.%p>.
4. Juwita R, Zulhaida, Jumirah. 2015. Pola Konsumsi Sarapan Pagi Murid Sekolah Dasar Di SDN 060921 Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2015. (skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan.

5. Tee, E Siong; Nurliyana, Abdul Razak; Karim, Norimah A; Jan Mohamed, Hamid Jan B; Tan, Sue Yee; Appukutty, Mahenderan; Hopkins, Sinead; Thielecke, Frank; Ong, Moi Kim; Ning, Celia and Mohd Nasir, Mohd Taib. Breakfast consumption among Malaysian Primary and Secondary School Children and Relationship with Body Weight Status - findings from the Mybreakfast Study [online]. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 27, No. 2, 2018: 421-432
6. Yudesti I, Prayitno N. Perbedaan Status Gizi Anak SD Kelas IV Dan V Di SD Unggulan (06 Pagi Makasar) Dan SD Non Unggulan (09 Pagi Pinang Ranti) Kecamatan Makasar Jakarta Timur Tahun 2012. 2013;5(1):2001–5.
7. Niswah, I., Damanik, M., & Ekawidnyani, K. (2014). Kebiasaan Sarapan, Status Gizi, Dan Kualitas Hidup Remaja Smp Bosowa Bina Insani Bogor. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 9(2). doi:http://dx.doi.org/10.25182/jgp.2014.9.2.%p
8. Watanabe Y, Saito I, Henmi I, Yoshimura K, Maruyama K, Yamauchi K, et al. Skipping Breakfast is Correlated with Obesity. *J Rural Med [Internet]*. 2014 [cited 2018 Feb 19];9(2):51–8
9. Nofitasari, A., Anggorodi, R. A., & Triyanti, T. (2009). Perilaku Sarapan Pagi Dan Kaitannya Dengan Prestasi Belajar Siswi Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 2 Depok. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 3(2), 46–52. https://doi.org/10.24893/JKMA.3.2.46-52.2009.
10. Ahmad S, Waluyo, Farissa F. 2012. Hubungan Kebiasaan Sarapan Pagi Dan Jajan Dengan Status Gizi Anak Sekolah Dasar Di SD Negeri Kledokan Depok Sleman Yogyakarta.(Skripsi). Universitas Respati, Yogyakarta.
11. Sopiandi, S., & Puspita, W. L. (2016). Analisis jenis, Jumlah dan Mutu Sarapan Pagi siswa sekolah dasar. *Jurnal Vokasi Kesehatan*, 2(1), 62–68. https://doi.org/10.30602/jvk.v2i1.56
12. Tanja VE Kral, Linda M Whiteford, Moonseong Heo, Myles S Faith; Effects of eating breakfast compared with skipping breakfast on ratings of appetite and intake at subsequent meals in 8- to 10-y-old children, *The American Journal of Clinical Nutrition*, Volume 93, Issue 2, 1 February 2011, Pages 284–291, https://doi.org/10.3945/ajcn.110.000505
13. Bi, H., Gan, Y., Yang, C., Chen, Y., Tong, X., & Lu, Z. (2015). Breakfast skipping and the risk of type 2 diabetes: A meta-analysis of observational studies. *Public Health Nutrition*, 18(16), 3013-3019. doi:10.1017/S1368980015000257.
14. Rania A Mekary, Edward Giovannucci, Walter C Willett, Rob M van Dam, Frank B Hu; Eating patterns and type 2 diabetes risk in men: breakfast omission, eating frequency, and snacking, *The American Journal of Clinical Nutrition*, Volume 95, Issue 5, 1 May 2012, Pages 1182–1189, https://doi.org/10.3945/ajcn.111.028209.
15. Hardinsyah, H., & Aries, M. (2016). Jenis Pangan Sarapan Dan Perannya Dalam Asupan Gizi Harian Anak Usia 6–12 Tahun Di Indonesia. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 7(2), 89-96. doi:http://dx.doi.org/10.25182/jgp.2012.7.2.89-96
16. Brown Larry et al. 2008. Impact Of School Breakfast On Childrens Health And Learning. Harvard School of Public Health.

17. Sandercock, G. R. H., Voss, C., & Dye, L. (2010). Associations between habitual school-day breakfast consumption, body mass index, physical activity and cardiorespiratory fitness in English schoolchildren. *European Journal of Clinical Nutrition*, 64(10), 1086–1092. <https://doi.org/10.1038/ejcn.2010.145>
18. Ozdogan Y, Ayse O, Metin S. (2010) The Breakfast Habits Of Female University Students. *Pakistan Journal of Nutrition* 9 (9): 882-886.
19. Fugas V, Berta E, Walz F, Fortino A, Martinelli MJ. 2013. Breakfast Habit And Quality In Students From Two Public Primary Schools In The City Of Santa Fe. *Arch Argent Pediatr* ;111(6):502–7.
20. C Okada, Tabutchi T, Iso H. 2017. Association Between Skipping Breakfast In Parents And Children And Childhood Overweight/Obesity Among Children: A Nationwide 10.5-Year Prospective Study In Japan. *International Journal of Obesity* volume 42, pages 1724–1732. <https://doi.org/10.1038/s41366-018-0066-5>
21. Meriska, I., Pramudho, K., & Murwanto, B. (2016). Perilaku Sarapan Pagi Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Kesehatan*, 5(1). doi:<http://dx.doi.org/10.26630/jk.v5i1.72>